

Como administrar levotiroxina ao seu bebê

O médico do seu bebê prescreveu levotiroxina a ele. Esse folheto explicará o que é a levotiroxina e como administrá-la ao seu bebê. Também dará informações úteis sobre a levotiroxina.

O QUE É A LEVOTIROXINA?

A levotiroxina é uma medicação que substitui o hormônio tireoidiano natural que a glândula tireoide do seu bebê não pode produzir.

COMO ADMINISTRO LEVOTIROXINA AO MEU BEBÊ?

Você pode administrar levotiroxina ao seu bebê seguindo estas etapas:

ETAPA 1

Triture o comprimido inteiro com a parte convexa de uma colher ou com um triturador de comprimidos.

ETAPA 2

Coloque todo o comprimido triturado no **bico** de uma mamadeira. Adicione uma pequena quantidade de leite materno, substituto de leite materno ou água ao bico.

ETAPA 3

Alimente seu bebê com o bico como faz normalmente. Quando seu bebê terminar de se alimentar, adicione um pouco mais de líquido ao bico e alimente seu bebê como faz normalmente. Repita esta etapa até que seu bebê termine todo o comprimido triturado e nenhum pó do comprimido reste no bico da mamadeira.

Você também poderá alimentar o seu bebê com uma colher ou seringa se ele não usar mamadeira. Nesse caso, adicione um pouco de leite/água/substituto de leite materno a uma colher ou seringa com o comprimido triturado e dê ao seu bebê. Adicione um pouco mais de líquido e repita o processo até que não reste nenhum pó do comprimido.

O QUE MAIS PRECISO SABER SOBRE A LEVOTIROXINA?

- **Tente administrar a levotiroxina uma hora antes de alimentar o seu bebê.** Se isso não for possível, tente administrar a levotiroxina de forma consistente todos os dias.
- **Não forneça a levotiroxina com substitutos de leite materno à base de soja, suplementos com cálcio ou com ferro.** Eles podem diminuir a quantidade de levotiroxina que o seu bebê absorve pela corrente sanguínea do intestino.
- **Seu bebê precisará de testes sanguíneos agendados para que possamos ajustar a dose de levotiroxina conforme o crescimento.** O médico do seu bebê dirá quando deve trazê-lo para realizar testes sanguíneos.

O seu bebê deve tomar _____ mcg de levotiroxina uma vez ao dia todos os dias

A próxima consulta do seu bebê será

Não misture o comprimido triturado com leite na mamadeira inteira.

Se o seu bebê vomitar ou cuspir antes de terminar a mamadeira, ele não receberá toda a dose da medicação.

É melhor fornecer o comprimido com pequenas quantidades de líquido no bico de uma mamadeira ou com uma colher até que o seu bebê termine o comprimido.