

Cómo darle la levotiroxina a su bebé

El médico de su bebé le ha recetado levotiroxina. Este folleto le explicará qué es la levotiroxina y cómo debe dársela a su bebé. También le brindará información útil sobre la levotiroxina.

¿QUÉ ES LA LEVOTIROXINA?

La levotiroxina es un medicamento que reemplaza a la hormona tiroidea natural que la glándula tiroidea de su bebé no puede producir.

¿CÓMO LE DOY LA LEVOTIROXINA A MI BEBÉ?

Siga estos pasos para darle la levotiroxina a su bebé:

PASO 1

Triture todo el comprimido con la parte de atrás de una cuchara o con un triturador de comprimidos.

PASO 2

Coloque todo el comprimido triturado en la **tetina** de un biberón. Agregue una pequeña cantidad de leche materna, leche maternizada o agua a la tetina.

PASO 3

Alimente a su bebé con la tetina como lo hace habitualmente. Cuando su bebé termine de alimentarse, agregue un poco más de líquido a la tetina y alimente a su bebé como lo hace habitualmente. Repita este paso hasta que su bebé consuma todo el comprimido triturado y no quede nada de polvo del comprimido en la tetina del biberón.

Si su bebé no usa biberón, también puede alimentarlo con una cuchara o una jeringa. En este caso, agregue un poco de leche/agua/leche maternizada a la cuchara o jeringa con el comprimido triturado y alimente a su bebé. Agregue un poco más de líquido y repita el proceso hasta que no quede más polvo del comprimido.

¿QUÉ MÁS DEBERÍA SABER SOBRE LA LEVOTIROXINA?

- **Trate de darle la levotiroxina a su bebé 1 hora antes de alimentarlo.** Si no puede hacerlo, trate de darle la levotiroxina de manera constante todos los días.
- **No le dé la levotiroxina con leche de soja, suplementos de calcio o de hierro.** Estos pueden disminuir la absorción de levotiroxina a nivel de los intestinos de su bebé y el pasaje hacia su torrente sanguíneo.
- **Su bebé necesitará que hagamos análisis de sangre programados para que podamos ajustar su dosis de levotiroxina a medida que crece.** El médico de su hijo le indicará cuándo debe traer a su bebé para los análisis de sangre.

Su bebé debe tomar _____ mcg (microgramos) de levotiroxina una vez al día todos los días.

La siguiente cita de su bebé es el:

La siguiente cita de su bebé es el:

No mezcle los comprimidos triturados con la leche dentro del biberón.

Si su bebé vomita o escupe antes de terminar el biberón, no ingerirá la dosis completa del medicamento.

Es mejor darle el comprimido con pequeñas cantidades de líquido en la tetina de un biberón o en una cuchara hasta que su bebé termine de ingerir todo el comprimido.