

# 肝臟手術後促進康復指南

麻省總醫院(Massachusetts General Hospital)  
手術結果和患者安全中心(COMPASS - 英語簡稱)

本小冊子旨在幫助您了解並為手術做好準備。

請在手術前查閱下列內容及詢問您的外科團隊任何問題。

## 有關我的手術的資訊

手術日期:	
手術時間:	您必須在手術預定時間前 2 小時到達。

您的外科醫生	辦公室電話號碼
David Berger 醫生	617-724-6980
Leigh Anne Dageforde 醫生	617-724-3730
Nahel Elias 醫生	617-643-0765
Cristina Ferrone 醫生	617-643-6189
Kenneth Tanabe 醫生	617-724-3868
Motaz Qadan 醫生	617-643-5153

- 手術前一天晚上 **10 時** 停止吃固體食物。
- 直到手術前不少於 **2 小時**，您可以喝清澈液體（見下文）

在手術前一天，請遵循外科醫生規定的飲食。如果您沒有規定的飲食，請如常吃喝。確保體內水分充足。

手術前不少於 2 小時為止，您可以繼續飲用清澈液體。請參閱下文列出清澈液體的清單。

手術前不少於 2 小時，您必須完全停止喝任何飲料。什麼也不要喝。

如果您患有糖尿病，您的血糖低或開始感到低血糖的症狀，請飲用含糖的清澈液體，例如蘋果汁，葡萄汁或普通蘇打水。如果這沒有幫助，請喝或吃任何會提高血糖的液體或流質。無論如何，延後手術總比忽視低血糖更好。

## 目錄

簡介 .....	3
我們為什麼對手術採用 ERAS 方針? .....	3
我會在醫院待多久? .....	3
手術前.....	4
我該如何準備手術? .....	4
手術前.....	4
術前通話.....	5
每日要達標的事.....	5
手術前 7-10 天肝臟手術前飲食.....	5
為什麼我需要遵循這種飲食?.....	5
手術前飲食的附加資訊.....	3
保持體內水分充足。 .....	4
手術前 2 天 .....	4
手術前 1 天 .....	4
吃健康均衡的早餐、午餐和晚餐，但必須在晚上 10 點前停止進食。 .....	4
手術當天早上 .....	5
依照麻醉科在術前通話中的指示服藥。 .....	5
任務清單.....	1
當您到達醫院時： .....	2
手術後.....	4
術後恢復室/麻醉後護理室.....	4
疼痛控制 .....	5
活動:我什麼時候可以開始移動，坐著和步行? .....	6
飲食：我什麼時候可以開始進食? .....	6
我的導尿管什麼時候會被拔除? .....	7
我什麼時候可以回家? .....	8
當我回家後，接著有什麼事? .....	9

## 簡介

本小冊子是 Mass General Brigham 之術後促進康復 (ERAS) 計劃的一部分，該計劃現已成為 Mass General Brigham 系統及其附屬醫院對所有手術患者的標準做法。本計劃與傳統的手術方法有所不同，已獲證實可以改善患者術後康復、減少併發症並減

### 我們為什麼對手術採用 ERAS 方針？

少術後住院天數。我們希望您（患者）也積極參與這個康復過程。總體目標是讓您對動手術方面有更好的體驗並儘快恢復正常。在您的幫助下，我們可以實現這些目標。

此計劃旨在讓您在手術前和手術後積極參與這康復過程。

此計劃的每個階段都經過量身定制，為了減少您的疼痛，避免併發症，並允許早日恢復飲食和活動。

### 我會在醫院待多久？

如果您進行的是小手術並且手術後沒有任何問題，您最早可以在手術後第一天回家。我們基於多種不同原因進行多種類型的手術，因此您住院的時間可能會較長。每天，您的手術團隊都會評估您是否具備出院的狀態，目標是儘快讓您出院回家。

## 手術前

如果您正在服用阿斯匹林(*aspirin*)、非類固醇抗發炎藥(*NSAIDs* - 英語簡稱)或任何類型的抗凝血藥物，請在手術前與您的外科醫生具體討論。

### 我該如何準備手術？

#### 手術前

1. **運動**可改善身體對壓力的反應及提升體能，從而有助於康復。如果您不經常鍛煉，建議慢慢開始。運動不需要劇烈，即使是每天 30-45 分鐘的步行比不做運動更好。
2. 除非另有指示，否則手術前 7-10 天應遵循低熱量、低碳水化合物**飲食**，以軟化肝臟，從而提高手術安全性。
3. 強烈建議您在手術前至少 3 週完全**停止抽煙**。這將降低手術期間和手術後肺部併發症的機會，並改善您的康復。如果您想了解更多有關如何戒煙的資訊，請聯繫您的醫生、護士或藥劑師。
4. 在手術前至少 24 小時（最好是一個月）避免**飲酒**。
5. **預先計劃** 安排一個人在您入院和出院的時候陪伴您。預先在家做好準備為您術後回家作安排。確保有足夠的食物和用品。您應該能夠如常步行，進食和照顧自己，但您最初可能需要家人或朋友的額外幫助，特別是避免在手術後立即進行耗體力的任務，例如洗衣、清潔、雜貨店購物等。
6. **保持體內水分充足**。在手術前 72 小時內，請務必經常喝水、飲用佳得樂 /Gatorade、寶萊德/Powerade、ClearFast 或其他清澈液體。

### 麻醉科會在手術前致電給您

## 術前通話

在手術前，您將收到 **2 次來電**，分別是外科團隊不同的成員，他們會與您談及有關護理的不同部分：

### 1. 麻醉團隊成員來電：

- ❖ 這個以電話進行的約診是預早安排，以確保您可以接聽此來電。

在此通話期間，醫護人員將：

- 與您確定在手術當天可服用的藥物，以及哪些 (如有任何) 藥物需要在手術前停止使用。
- 提出問題評估您的健康狀況並解釋手術過程。

### 2. 外科醫生的手術協調員來電：

- ❖ 手術前 1-3 天，您將接到來電，確定您的手術時間並確認您需要到達辦理報到的確實時間。

*如果您在閱讀這些說明後仍有其他問題，請聯絡您的外科醫生辦公室。*

## 手術前 7-10 天肝臟手術前飲食

### 每日要達標的事

- 800-1000 卡路里
- 60-100 克蛋白質。對於身體質量指數(BMI-英語簡稱)大於50的人來說，蛋白質攝取量是80-100克。
- 80-100 克碳水化合物
- 每天飲用 48-64 盎司零熱量、脫咖啡因的液體

### 為什麼我需要遵循這種飲食？

透過遵循嚴格的飲食，您的身體會減少肝醣儲存（肝醣是儲存在肝臟和肌肉中以提供能量的一種形式的糖）。每盎司肝醣，身體可儲存 3-4 盎司水。因此，當您遵循非常嚴格的飲

食時，尤其是澱粉和糖含量低的飲食，您的身體會失去肝醣儲備和一些水分。肝醣減少，肝臟也隨之縮小。*透過稍微縮小肝臟的大小，可以更安全地進行手術。*

### 乳糖不耐症患者的特別注意事項

建議您選擇 Boost Diabetic 作為蛋白奶昔代餐，因為它不含乳糖。您將看到多種膳食選擇，包括酸奶，低脂條狀乳酪，低脂農家鮮奶酪。大多數乳糖不耐症的人可以食用酸奶而不會出現脹氣或腹脹，但可能需要在吃農家鮮奶酪時服用乳糖酶。

### 糖尿病患者的特別注意事項

這種飲食很可能會大大減少您一般攝取的碳水化合物和卡路里。如果您正在服用糖尿病藥物（胰島素、二甲雙胍(metformin)、格列吡嗪(glipizide)等），則在開始這種飲食之前，您必須聯繫您的糖尿病臨床醫生討論您的血糖管理。仔細監測您的血糖，並讓您的醫生根據需要調整您的藥物。如果您有任何疑慮，請根據需要諮詢您的醫生。目標是減少您的胰島素以保持血糖正常，而不是增加食物。但是，如果您的血糖確實降得太低 (<60)，則以下每種食品可提供 15 克碳水化合物，可在發生低血糖反應時使用：

- 4 盎司 (½ 杯) 100% 果汁 (不加糖)
- 8 盎司 (1 杯) 脫脂牛奶
- 1 湯匙普通果凍或 1 ½ 湯匙 Polaner 無糖果醬
- 1 湯匙蜂蜜

**數字「15」的法則：**(從上方選擇)攝取 15 克碳水化合物等待 15 分鐘並重新檢查您的血糖。每 15 分鐘攝取 15 克碳水化合物，直到血糖達到 60。

	選項 1	選項 2	選項 3	選項 4
<b>早餐</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 杯 Kashi GoLean 原味麥片</li> <li>• 8 盎司脫脂奶或豆奶</li> </ul> <p>230 卡路里 21 克蛋白質 42 克碳水化合物</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 蛋白質飲料</li> <li>• ½ 杯水果</li> </ul> <p>240 卡路里 20 克蛋白質 20 克碳水化合物</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-2 個雞蛋</li> <li>• 低卡路里英式鬆餅</li> <li>• 1 片(1 盎司)低脂乳酪</li> </ul> <p>200 卡路里 18 克蛋白質 25 克碳水化合物</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¾ 杯原味希臘酸奶</li> <li>• ½ 杯莓果</li> </ul> <p>160 卡路里 18 克蛋白質 14 克碳水化合物</p>
<b>午餐</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¾ 杯低脂農家鮮奶酪</li> <li>• ½ 杯水果</li> </ul> <p>195 卡路里 21 克蛋白質 20 克碳水化合物</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 蛋白質飲料</li> <li>• ½ 杯水果</li> </ul> <p>240 卡路里 20 克蛋白質 20 克碳水化合物</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 份冷凍瘦肉 (Lean Cuisine、Smart Ones、Healthy Choice)</li> </ul> <p>300 卡路里 18 克蛋白質 30 克碳水化合物</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 盎司火雞</li> <li>• ½ 片全麥皮塔餅</li> <li>• 1 茶匙芥末</li> <li>• 1 杯非澱粉類蔬菜</li> </ul> <p>255 卡路里 28 克蛋白質 27 克碳水化合物</p>

<b>晚餐</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 盎司瘦肉</li> <li>• 2 杯沙拉</li> <li>• 1 湯匙低脂調味料</li> <li>• ½ 杯馬鈴薯、豌豆、玉米、冬季南瓜或 ⅓ 杯米飯或義大利麵</li> </ul> 275 卡路里 28 克蛋白質 25 克碳水化合物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 蛋白質飲料</li> <li>• ½ 杯水果</li> </ul> 240 卡路里 20 克蛋白質 20 克碳水化合物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¼ 杯原味希臘酸奶</li> <li>• ½ 杯莓果</li> </ul> 160 卡路里 18 克蛋白質 14 克碳水化合物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 盎司罐頭鮭魚（水中保存）</li> <li>• 2 杯蔬菜沙拉</li> <li>• 1 湯匙蔓越莓乾</li> <li>• 1 湯匙低脂調味料</li> </ul> 255 卡路里 28 克蛋白質 27 克碳水化合物
<b>零食小吃</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 根無糖冰棒</li> <li>• 2 條低脂乳酪</li> </ul> 190 卡路里 14 克蛋白質 8 克碳水化合物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 蛋白質飲料</li> <li>• 2 支無糖冰棒</li> <li>• ½ 杯水果</li> </ul> 240 卡路里 20 克蛋白質 20 克碳水化合物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¼ 杯原味希臘酸奶</li> <li>• ½ 杯莓果</li> </ul> 160 卡路里 18 克蛋白質 14 克碳水化合物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ½ 杯低脂乳清奶酪</li> <li>• 一小份水果</li> </ul> 220 卡路里 14 克蛋白質 19 克碳水化合物
<b>合共</b>	890 卡路里 84 克蛋白質 95 克碳水化合物	930 卡路里 80 克蛋白質 73 克碳水化合物	935 卡路里 82 克蛋白質 94 克碳水化合物	895 卡路里 85 克蛋白質 88 克碳水化合物

### 重要提示：

- 每天至少喝 64 盎司液體（無糖，每份 10 卡路里或更少）。
- 如果尚未服用完整的多種維生素，請開始服用。
- 開始服用 sennosides/docosate (Senokot-S) 8.6-50 毫克。每日口服 2 片。

如果排便變得太稀或太頻繁，請停用。或者，您可以喝 Smooth Move® 茶。

### 手術前飲食的附加資訊

追蹤每日攝取量，確保您達到每日目標。營養資訊可以在營養標籤上找到，也可以透過以下網站在線查看：

- [www.calorieking.com](http://www.calorieking.com)
- [www.fitday.com](http://www.fitday.com)
- [www.myfitnesspal.com](http://www.myfitnesspal.com)

以下是可接受的 **蛋白質飲料選項**（可在 GNC、沃爾瑪(Walmart)、雜貨店、網上購買。即飲型及粉末型皆可）：

- Slim Fast Low Carb
- Carnation Instant Breakfast(不加糖)
- Atkins Advantage Shakes
- Boost Glucose Control



- Ensure High Protein
- EAS Advantage Carb Control
- Pure Protein
- Isopure Zero Carb
- Unjury
- Premier Protein
- Protica Proasis Protein Shot

只要達到卡路里、蛋白質和碳水化合物的用量目標，每天的正餐和零食選擇可以混合搭配。

**非澱粉類蔬菜** 包括除豌豆、玉米和冬季南瓜之外的所有蔬菜。

#### 瘦肉包括

- 牛肉：牛腿肉、西冷牛肉、里脊牛肉
- 豬肉：加拿大培根、里脊肉、中腰排
- 家禽(雞肉或火雞肉)：去皮的白肉或黑(深色)肉
- 魚

根據需要使用 **香料和無熱量甜味劑** 為食物添加風味。

如果您患有糖尿病和/或正在服用利尿劑 (例如 Lasix 和/或氫氯噻嗪-hydrochlorothiazide)，請在開始這種飲食之前約見您的基層保健醫生，在藥物劑量沒有適當調整下，該飲食可能會導致低血糖和脫水。

## 手術前 2 天

**保持體內水分充足。**

整天內請喝水、Gatorade、Powerade 或 Pedialyte。

## 手術前 1 天

**吃健康均衡的早餐、午餐和晚餐，但必須在晚上 10 點前停止進食。**

這樣可以減少引起麻醉併發症的機會。我們要求所有患者在手術前一天晚上 10 時停止進食。

即使您不吃固體食物，您也可以繼續喝清澈的液體，直到不少於手術開始時間前 2 小時。 清澈液體是指任何可以看透的液體（乳製品飲料，包括牛奶和酸奶，以及橙汁都不是清澈液體。）

此外，我們特別要求您一整天飲用佳得樂/Gatorade、水、Pedialyte 或下面列出的其他清澈液體以補充水分。

睡前，喝 20 至 24 盎司 Pedialyte 或佳得樂/Gatorade（紅色不可）。

**注意：**請仔細遵循這些說明。如果您在手術前 8 小時內吃過固體食物或喝了牛奶，您的手術通常會被取消。

## 手術當天早上

依照麻醉科在術前通話中的指示服藥。

這些藥可以與 Pedialyte、佳得樂/Gatorade（紅色不可）或水一起服用

## 任務清單

<b>手術前 7-10 天</b>	
遵循肝臟手術前飲食	
<b>手術前 2 天</b>	
保持體內水分充足。	
<b>手術前一天</b>	
可以吃早餐、午餐和晚餐。	
<p>晚上十時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 停止吃所有固體食物或乳製品</li> <li>● 停止嚼口香糖，停止吃糖果</li> </ul> <p>從現在開始，您只能飲用清澈液體 - 請參閱下文列出可飲用的清澈液體</p> <p><input type="checkbox"/> 晚上持續飲用清澈液體，以保持體內水分充足。</p>	
<p><b>允許</b></p> <p>水</p> <p>果汁（清澈及不含果肉）</p> <p>紅茶或黑咖啡（不含牛奶/奶油）</p> <p>Pedialyte</p> <p>佳得樂/Gatorade（紅色不可）</p>	<p><b>不允許</b></p> <p>固體食物/牛奶/酸奶</p> <p>乳製品飲料(冰沙)/奶油</p> <p>橙汁/豆奶</p> <p>杏仁/堅果奶</p>
<p><b>上床睡前</b></p> <p><input type="checkbox"/> 喝 20-24 盎司 Pedialyte 或佳得樂/Gatorade（紅色不可）</p>	
<b>手術當天</b>	
<p><b>至少在預定手術前 2 小時：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 您必須完全停止喝飲料。</p> <p><input type="checkbox"/> 如果您忘了喝清澈液體，不要緊。此時不要喝任何飲料，當您抵達醫院時，我們將會從靜脈輸液給您。</p>	

## 當您到達醫院時：

**入院程序：**請從醫院正門入口或王氏日間醫療中心(Wang Ambulatory Care Center)進入。前往王氏(Wang)大樓第三層。您將在手術護理中心（CPC-英語簡稱）辦理報到手續。完成報到手續後，工作人員將帶您到手術前等候區。

- 護士會測量您的生命體徵，也可能測量葡萄糖水平。
- 您也會與手術室護士見面。

### 1. 麻醉科團隊：

- 會給有助防止疼痛、噁心和嘔吐的口服藥。
- 為您置入靜脈導管，在手術期間或術後輸注所需的液體，藥物或血液。
- 檢討手術期間和術後所採用的疼痛管理方案。

### 2. 外科團隊：

- 討論您的程序並回答任何問題或疑慮。
- 完成所需的文書事項。

*麻醉科醫生負責監測您的生命體徵(心率、血壓、體溫和呼吸), 液體和血液置換(如有需要), 以及您在手術期間的整體舒適度。*

### 當您到達醫院時（續前）：

**手術室**：團隊為您的手術作準備，同時也協助您躺在手術室檯上，並讓您感到舒適。

- **靜脈導管(IV - 英語簡稱)**— 可能再置入另一個IV，手術期間有需要時給藥。這些藥物包括抗生素、止痛藥和止嘔藥物等。
- **導尿管** — 導尿管會置入膀胱以排出尿液。導管將在手術後就位，但您的手術團隊將在適當的時候將其移除。
- 給麻醉劑後，您將進入睡眠狀態。
- 有些患者接受硬膜外麻醉或神經阻斷，以控制手術中和手術後的疼痛。您的麻醉醫生和外科醫生將在手術前與您討論這一點。

*硬膜外麻醉是將止痛藥注射到靠近脊髓的部位。這是由麻醉科醫生完成的。這些藥物透過麻痺神經來緩解您身體某些部位的疼痛。硬膜外麻醉有時在手術期間與鎮靜劑和麻醉劑結合使用，也可以單獨使用。*

## 手術後

*重要事項：以下指南可能會根據手術的個別情況、康復狀態和外科醫生的偏好而有所不同。*

### 術後恢復室/麻醉後護理室

手術結束後，團隊會將您轉送到麻醉後護理室（PACU - 英語簡稱）。您可能仍然會感到困倦和失去方向感。這是正常的，與您在手術期間接受麻醉劑有關。這些藥物需要一段時間才能消退。

手術過後，您將在恢復室接受至少 1-2 小時的監測。在此期間，您會預期以下大部分情況：

- 護士們經常檢查您的生命體徵 - 血壓、心率、呼吸和體溫、血糖水平以及傷口和敷料。
- 麻醉團隊檢查您的疼痛程度。
  - 可能仍然保留硬膜外麻醉以控制您的疼痛，及/或仍施行特殊神經阻斷以覆蓋手術切口的疼痛。
- 經鼻或面罩持續給您供氧氣
- 持續經 IV 輸液和止痛藥物

您在 PACU 穩定下來後，1-2 名家庭成員/朋友可以短暫探望您。當團隊認為您的情況穩定，您會被送出恢復室轉到住院部指定的房間。有些患者會在恢復室過夜。最快在手術後幾個小時，恢復室護士會要求您站立、移到椅子上坐或步行。有大量證據表明，術後儘快活動的患者恢復得更快、更好。

*為了讓患者及其家人安睡休息，探訪時間於晚上 9 點結束。*

## 疼痛控制

良好的疼痛控制是康復過程的重要一環。手術後您應該會感到一些疼痛。沒有辦法完全消除疼痛，但有多種方法可以幫助您管理疼痛。如果您有任何疼痛或不適，請告知您的護士或醫生。我們的目標是讓您在手術後對疼痛的評分為 3 或更低（見下文）。

### 疼痛強度量表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
沒有疼痛				中度疼痛					最嚴重的疼痛

我們的目標是控制您的疼痛在一個水平，以致您可以好好的睡和休息、更輕鬆地呼吸以及更快開始步行。這是很重要的，因為它有助於預防血栓和肺炎等併發症。步行也有助於腸道功能的恢復，讓您走上康復之路。

## 活動：我什麼時候可以開始移動，坐著和步行？

您一醒來就可以開始移動，但最好保持緩慢進行。因此，您應該先從一些基本的腿部練習開始，例如擺動腳趾、伸直雙腿和轉動腳掌。每半小時做這些動作幾分鐘。它將幫助您更快地站起來。如果它引起疼痛，請停止做並告知您的護士或醫生。您的醫療團隊希望您在手術後 8 小時內能站立。

*避免挪動和長時間躺在床上，可能會導致血栓、褥瘡和肌肉無力等併發症。這會減慢您的康復速度。您的團隊將持續監控您是否能起床。*

- **手術後 3-8 小時：**手術後 8 小時內，您應該能夠坐在床邊、站立或移到椅子上坐。您的護士會幫助您，尤其是在您第一次起床時。如果您感覺良好，也可以短距離步行。務必有人在身邊隨時幫助您，因為您可能會感到虛弱且腳步不穩。
- **手術後第一天：**從手術後的第一天開始，您的目標是每天至少下床 3 或 4 次，並在走廊上步行。我們也希望您坐在椅子上用餐。一開始有人會幫助您，直到您的體力恢復能夠自己坐起來為止。

**呼吸練習：**務必在手術後深呼吸以防止肺部感染。護理人員會向您展示一些有幫助的呼吸練習。在您看電視的時候，每次播放廣告就做幾下深呼吸也是一個很好

*開腹手術後，您的腸道可能會暫時停止蠕動。如果發生這種情況，您可能會感到噁心和腹脹，並可能延長您的康復時間。頻繁地步行可以避免出現這種情況。*

的做法。清醒時，每小時至少做 5-10 次這些簡短的呼吸練習。

## 飲食：我什麼時候可以開始進食？

如果一切順利：

- 手術當天：啜飲少量水
- 術後第 1 天：清澈液體或全流質飲料
- 術後第 2 天：全流質飲料



- 術後第 3-4 天：只要可以忍受，全面軟食
- 對於腹腔鏡肝切除術，您可能會在第 1-3 天出院。
- 您的醫生將決定何時適合進入下一步。一般來說，當您能夠飲用至少 10 盎司的液體，您的靜脈輸液就會停止。

### 我的導尿管什麼時候會被拔除？

- 大多數患者在手術後第一天就會移除導尿管。有些時候，導尿管可能會留置更長的時間。
- 拔除導尿管後，您就可以隨時去浴室小便了。您可能需要等 4-8 小時才會感到尿急。這是正常的現象。

*留置導尿管的時間過長可能會導致泌尿道感染。*

*尿道感染的症狀包括：*

- 排尿時疼痛、
- 尿頻、
- 儘管膀胱是空的，仍感覺需要小便、
- 發燒及感到一側疼痛。

*如果有任何這些症狀，請立即告知您的護士或醫生。*

## 我什麼時候可以回家？

要做好出院準備，您必須完成下列所有事項：

- 口服藥物可以很好地控制疼痛
- 能夠攝入足夠的液體以保持體內水分充足

一旦您的疼痛得到良好控制並且喝足夠的水，您就可以出院回家。否則，您將在醫院接受觀察，直到達標。一旦您能夠喝下足夠的液體、活動良好並且疼痛得到良好控制，您的手術團隊就會讓您出院。住院時間過長的患者發生感染等術後併發症的風險較高。

一般來說，您出院前不需要做到排氣或排便，但在某些情況下，您的外科醫生可能會要您做到。

### 注意事項：

請計劃從醫院出發的交通和在家護理的適當安排 如果您的團隊認為您已經準備好，他們會在出院前一天通知您。退房時間為上午 **10** 時。如果接載您的車輛在此時無法到達麻省總醫院(MGH)，請不要擔心。我們會幫助您安頓在等候室，讓您等待他們到來。

## 當我回家後，接著有什麼事？

外科醫生的護士會在您出院後的第一天致電給您。

您的出院文件將包括您的處方、如何服用、需要注意的事項以及所有相關的聯繫資訊。如果您在日常辦公時間內有疑問，請撥打提供的診所電話並要求與護士交談。如果您在辦公時間以外遇到緊急事故，您可以致電傳呼值班醫生或前往急診室就診。

病理報告在手術後 7-10 個工作天內發出。辦公室將與您聯繫並告知這些資訊和您的治療方案。

*患者面對手術的壓力很大，有見及此我們很榮幸成為您的護理團隊。我們期待與您共同面對，讓您的手術獲得最佳體驗。如果您在閱讀這本冊子後有任何問題或疑慮，請聯繫您的外科醫生辦公室。*