

يستدعي تلقي لقاح كوفيد-19 بعد جراحة السرطان إزالة العقد اللمفية من الإبط

برنامج مستشفى ماساشوستس العام لأبحاث الوبئة اللمفية

- تورم العقد اللمفية من آثار لقاح كوفيد-19 الجانبية المعروفة، وهو رد فعل جسديك الطبيعي على اللقاح.
- قد يثير هذا الأمر قلقك إذا كنت قد خضعت لاستئصال العقد اللمفية تحت إبطك. قد يؤدي استئصال العقد اللمفية وعلاج العقد اللمفية بالإشعاع إلى حدوث وذمة لمفية بعد علاج السرطان.
- نحثك على تلقي لقاح كوفيد-19 عندما تصبح مؤهلاً له. ويجب عليك مناقشة أي مخاوف قد تساورك مع طبيبك.

ننصحك بما يلي:

- إذا كانت لديك وذمة لمفية، فاطلب تلقي لقاح كوفيد-19 في الذراع المقابلة أو في الساق.
- إذا كنت عرضةً لحدوث وذمة لمفية، فاطلب تلقي لقاح كوفيد-19 في الذراع المقابلة أو في الساق.
 - الأشخاص الذين خضعوا لتشريح العقد اللمفية أكثر عرضةً لخطر حدوث الوذمة اللمفية.
 - الأشخاص الذين خضعوا لخزعة العقدة اللمفية الخافرة أقل عرضةً لخطر حدوث الوذمة اللمفية. ويظل خطر حدوث الوذمة اللمفية موجوداً على الرغم من تدنيه.
- إذا كنت قد خضعت لإزالة العقد اللمفية على كلا الجانبين، فيجب عليك أن تطلب تلقي اللقاح في ساقك؛ وإذا تعذر ذلك، ففي الذراع التي أزيل منها العدد الأقل من العقد اللمفية.
- يمكن إعطاء لقاحي كوفيد-19 من فايزر و Moderna في الساق.
 - هذا الخيار وارد في مستندات لقاحي فايزر و Moderna الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control and Prevention,) الإلكترونية. راجع الحاشية في أسفل الصفحة 1 أسفل الجدول:

[-by-info/19-covid/vaccines/gov.cdc.www://https
downloads/standing-orders.pdf](https://www.cdc.gov/19-covid/vaccines/downloads/standing-orders.pdf)//**modernaproduct** ○

[-by-info/19-covid/vaccines/gov.cdc.www://https
downloads/standing-orders.pdf](https://www.cdc.gov/19-covid/vaccines/downloads/standing-orders.pdf)//**pfizerproduct** ○